




# Chorlo de pico grueso (*Charadrius wilsonia*)

Cuadernillo de actividades



CONSERVANDO ECOSISTEMAS COSTEROS



Aves Honduras



manomet

pro natura



Los Amigos UABCS de Aves



Cuidando al Flayero rojizo y al Pejerrey



# Chorlo de pico grueso

## (*Charadrius wilsonia*)




### Un chorlo diferente

El chorlito de pico grueso es un ave playera de **tamaño chico** que está estrechamente asociada con las áreas costeras.

Tiene una sola banda en el pecho y **se distingue fácilmente de los chorlitos similares por su grueso pico negro y tamaño más grande.**



También conocido como **frailecillo de Wilson**, esta especie fue nombrada así por Alexander Wilson quien registró por primera vez a la especie en 1813 en Cape May, Nueva Jersey, EE UU.



Se alimenta principalmente de crustáceos, especialmente cangrejos violinistas, pero también se alimenta de insectos, gusanos y otros invertebrados.

El chorlo de pico grueso anida en áreas salinas de escasa a densa vegetación, incluyendo playas sobre marea alta, áreas de dunas y bordes de lagunas.


## Distribución

Se reproduce a lo largo de la costa atlántica desde el sur de Virginia, a lo largo del Golfo de México y el Caribe, hasta el noroeste de Brasil, y en la costa del Pacífico desde el sur de Baja California hasta el norte de Perú.

Se ha mostrado que la parte oriental del Golfo de Fonseca (aproximadamente el área entre Punta Condega y los humedales El Jicarito y La Berbería) es de Importancia Regional para las aves playeras.


Esta zona relativamente pequeña acoge regularmente a **más de 20,000 aves playeras**, así como a **más del 1% de las poblaciones biogeográficas** del chorlo de pico grueso.

En el Golfo de Fonseca converge una población residente muy reducida de *Charadrius wilsonia*, que se une a la población migratoria de las subespecies de *Ch. wilsonia beldingi* y potencialmente a *Ch. wilsonia wilsonia*.




## Reproducción

Las parejas reproductoras son territoriales durante la temporada de anidación, y pueden participar en la defensa grupal de sus áreas de anidación. Durante la temporada no reproductiva, los individuos se congregan para descansar y alimentarse en grupos que van desde unas pocas aves hasta varios cientos, principalmente con otras especies de chorlitos.



## Población y amenazas

La **pérdida de hábitat** de playa por urbanización y otro desarrollo humano es una de las **principales amenazas para esta especie**. La perturbación de las zonas de anidación debido a la recreación y gestión de las playas es también una causa importante de la disminución de la población. Como ave costera obligada, el chorlito de pico grueso también es susceptible al aumento del nivel del mar.



## Encuentra el mensaje oculto

El chorlo de pico grueso es considerada una especie y migratoria que suele reproducirse en salineras. Se sabe que el sitio

con mayor de chorlo de pico grueso es Punta Ratón, ubicado dentro del Golfo de .

Esta ave se alimenta principalmente de , insectos, gusanos y otros invertebrados.

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	V
Y	Z				



¡Toma un momento para apreciar a esta ave en una salinera de Honduras!

¡Escanea el código para averiguarlo o busca en el siguiente enlace!

[www.youtube.com/watch?v=a4q7ytl1bzo&ab\\_channel=OliverKomar](https://www.youtube.com/watch?v=a4q7ytl1bzo&ab_channel=OliverKomar)





## Sopa de letras: ¡Vamos a identificarla!

W	F	M	I	X	E	Í	D	F	Z	W	N
Í	Ñ	G	R	U	R	A	A	R	R	I	A
S	Q	G	R	U	E	S	O	A	U	L	G
O	H	Í	H	U	V	Ü	Í	I	Í	S	K
T	U	Z	R	Y	Ú	N	M	L	O	O	E
I	R	M	K	N	Á	B	T	E	R	N	Q
L	G	R	Q	Q	O	A	D	C	G	Á	T
R	Ó	J	I	M	Ñ	N	B	I	E	Ñ	C
O	M	K	A	D	M	D	R	L	N	T	G
H	Ñ	J	M	M	E	A	É	L	F	I	C
C	T	B	Ú	E	E	B	J	O	G	P	I
Á	V	T	P	I	L	F	Á	R	W	P	O



¿Sabes cómo iniciaron las primeras observaciones del Chorlo de pico grueso en la Salinera de Santa Alejandra?

¡Escanea el código para averiguarlo o busca en el siguiente enlace!

[www.whsrn.org/es/charadrius-wilsonia-salinera-santa-alejandra/](http://www.whsrn.org/es/charadrius-wilsonia-salinera-santa-alejandra/)



El chorlo de pico \_\_\_\_\_ se caracteriza porque tiene solo una \_\_\_\_\_ en el pecho. Su pico es \_\_\_\_\_ y más grande que el de otros \_\_\_\_\_.

Otro nombre con el que se le conoce es \_\_\_\_\_

de \_\_\_\_\_.

- chorlitos
- frailecillo
- negro
- grueso
- Wilson
- banda







# Paso a paso dibujando al Chorlo de pico grueso

En otra hoja sigue los pasos para dibujar al Chorlo de pico grueso (*Charadrius wilsonia*).


**1** Traza figuras geométricas.




**2** Delinea la figura del cuerpo.




**3** Borra las figuras guía y traza los primeros detalles.



**4** Dibuja los detalles finales.



**5** Colorea y ¡listo!








¡Encuentra cursos sobre aves playeras y otros temas aquí!



<https://bitly.ws/TrgD>

## **Coloreando al Chorlo de pico grueso**

Colorea este chorlo de pico grueso y dibuja el hábitat donde vive.



CONSERVANDO ECOSISTEMAS COSTEROS



Cuidando al Flayero rojizo y al Pejerrey

